

# Pflegeanleitung für Extensivbegrünungen

Bei Extensivbegrünungen können folgende Pflege- und Wartungs-Leistungen erforderlich werden:

## – Entfernen von nicht standortgerechtem Fremdbewuchs

Jährlich müssen aufkommende Gehölze (wie Birken, Weiden) und Kräuter (wie Klee, Löwenzahn, Wicken, usw.) am besten mit Wurzeln und vor dem Aussamen entfernt werden. Die Pflanzen müssen vom Dach gebracht werden.

## – Freihalten von Rand- und Sicherheitsstreifen sowie von Platten- und anderen Belägen von unerwünschtem Aufwuchs

Das Entfernen von unerwünschten Pflanzen betrifft nicht nur die eigentliche Begrünungsfläche, sondern auch Kiesstreifen, Wege und angrenzende Terrassen.

## – Entfernen von Laub

Laub von benachbarten Bäumen muss entfernt werden.

## – Düngen

In der Regel jährlich im Frühjahr (April/Mai) soll ein Langzeitdünger mit 5 g reinem Stickstoff gleichmäßig auf die Begrünungsfläche ausgebracht werden. Vor allem starker Moosbewuchs bzw. auffällig rotgefärbte Sedum-Arten können Anzeichen für Nährstoffmangel sein.

## – Säubern von Kontrollschächten, Dachabläufen und anderen Entwässerungseinrichtungen

Kontrollschächte und die darunter liegende Dachabläufe müssen jährlich überprüft und von Verunreinigungen (Ameisenbauten, Schmutz, Laub, Kalkablagerungen u.ä.) gesäubert werden. Der Ablaufquerschnitt darf sich nicht verändern. Das Genannte gilt auch für Entwässerungsrinnen.

## – Wässern

In der Regel wird eine Extensivbegrünung nach der Fertigstellungspflege, d.h. wenn der Bestand die Fläche deutlich über die Hälfte bedeckt und ein Jahr alt ist, nicht mehr bewässert. Selbst bei einem heißen und trockenen Sommer ist normalerweise eine Bewässerung nicht notwendig. Ausnahmen könnten sein: sehr dünnschichtige Begrünungen unter 7 cm und Steildächer unter 10 cm mit Südexposition

## – Nachsaaten bzw. Nachpflanzen bei Fehlstellen, eventuell Nachfüllen von Substrat

Sollten Bereiche (ca. größer als 0,5 m<sup>2</sup>) nicht bewachsen sein bzw. an bestimmten Stellen Erosionen aufgetreten sein, muss ggf. Dachbegrünungssubstrat nachgefüllt und geeignete Flachballenstauden gesetzt oder Saatgut + Sedum-Sprossen ausgestreut werden. Der geeignete Zeitraum dafür ist der April/Mai und eventuell der September/Oktober

In der Regel sind 1 (September/Oktober) bis 2 Pflegegänge (März/April und September/Oktober) pro Jahr erforderlich.